

Αγρομετεωρολογικό Δελτίο Νοεμβρίου

Εβδομαδιαία πρόγνωση για την
περίοδο:

03 - 09 Νοεμβρίου 2025

Παρουσίαση: **Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου**



Περιεχόμενα

- [Εισαγωγή στην Αγρομετεωρολογία](#)
- [Αγρομετεωρολογικό Δελτίο – Αγρομετεωρολογικά δεδομένα](#)
- [Οδηγίες φυτοπροστασίας και καλής πρακτικής για τους αγρότες για τις καλλιέργειες Νοεμβρίου](#)
[Ελιές](#)
[Αμπέλια](#)
[Εσπεριδοειδή](#)
[Πατάτες](#)
[Φυλλοβόλα](#)
[Σιτάρι και Κριθάρι](#)
- [Χάρτης Σταθμών Αναφοράς](#)
- [Σταθμοί Αναφοράς και Βασικές Καλλιέργειες ανά σταθμό](#)
- [Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού](#)
[Συνοπτική κατάσταση περιόδου](#)
[Πόλις Χρυσοχούς](#)
[Αερ. Πάφου](#)
[Αυδήμου](#)
[Νέο Λιμάνι Λεμεσού](#)
[Πεντάκωμο](#)
[Αερ. Λάρνακας](#)
[Άχνα](#)
[Αθηνών](#)
[Αστρομερίτης](#)
[Κανναβιού](#)
[Επταγώνεια](#)
[Αγρός](#)
- [Εξαμισοδιαπνοή Αναφοράς](#)
- [Εβδομαδιαίος Χάρτης Κατανομής της Βροχόπτωσης](#)
- [Προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα](#)
- [Αποποίηση Ευθυνών](#)
- [Διάφοροι Σύνδεσμοι για περισσότερες πληροφορίες](#)
- [Συνεργάτες](#)

Εισαγωγή στην Αγρομετεωρολογία

Η Αγρομετεωρολογία είναι ζωτικής σημασίας για τον αγροτικό τομέα καθώς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις καιρικές συνθήκες και το κλίμα, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη των καλλιεργειών και την απόδοση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ιδιαίτερα τώρα με την επιταχυνόμενη κλιματική αλλαγή, οι μεταβολές στις καιρικές συνθήκες όπως οι ακραίες θερμοκρασίες, οι απρόβλεπτες βροχοπτώσεις και οι συχνότεροι παγετοί ή ξηρασίες επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή των καλλιεργειών.



Μέσω της αγρομετεωρολογίας, οι αγρότες μπορούν να λαμβάνουν ακριβείς προγνώσεις και να προσαρμόζουν τις γεωργικές τους πρακτικές ώστε να προστατεύσουν τις καλλιέργειές τους από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Επίσης, η αγρομετεωρολογία βοηθά να εφαρμόζουν βιώσιμες μεθόδους άρδευσης και διαχείρισης των πόρων, μειώνοντας τις απώλειες και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των καλλιεργειών τους. Η συνεχής παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών είναι κρίσιμη για να διασφαλιστεί η παραγωγικότητα και η ασφάλεια των τροφίμων σε ένα ασταθές κλιματικό περιβάλλον.



Αγρομετεωρολογικό Δελτίο

Το Αγρομετεωρολογικό Δελτίο καταγράφει από ένα δίκτυο επιλεγμένων μετεωρολογικών σταθμών την πορεία των βασικών αγρομετεωρολογικών παραμέτρων ανά εβδομαδιαία βάση, για διάφορες περιοχές του νησιού. Προκειμένου να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τα κλιματικά και αγρομετεωρολογικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε μήνα παρουσιάζονται τα κλιματολογικά δεδομένα των κύριων σταθμών αναφοράς.

Αγρομετεωρολογικά δεδομένα

- [Θερμοκρασία](#) (ημερήσια μέγιστη και ελάχιστη)
- [Άνεμος](#) (διεύθυνση και ένταση)
- [Υετός](#)
- [Σχετική Υγρασία](#)
- [Εξατμισοδιαπνοή Αναφοράς](#)

Για περισσότερες περιοχές και παραμέτρους



<https://agromet.dom.org.cy/>



Αγρομετεωρολογικό Δελτίο

Αγρομετεωρολογικά δεδομένα

- **Θερμοκρασία:** η θερμοκρασία του αέρα μετριέται στα 1.2 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους και δίνεται σε βαθμούς Κελσίου (°C).
- **Άνεμος:** στους περισσότερους σταθμούς αναφοράς ο άνεμος μετριέται στα 10 μέτρα, με τη διεύθυνση να μετριέται σε μοίρες (0 - 360°), με αναφορά στον γεωγραφικό βορρά και την έντασή του να μετριέται συνήθως σε κόμβους (knots).
- **Βροχή:** η μέτρηση της βροχής γίνεται με τα βροχόμετρα, τα οποία καταγράφουν την ποσότητα της βροχής σε χιλιοστά (mm) κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.
- **Σχετική Υγρασία:** αποτελεί ένα μέτρο του πόσο κοντά στο να κορεστεί από υδρατμούς είναι ο αέρας. Εκφράζεται σε % και η μέτρηση της σχετικής υγρασίας είναι σημαντική για τη γεωργία, καθώς επηρεάζει την ανάπτυξη των καλλιεργειών, τις ασθένειες και τη διαχείριση του νερού.
- **Εξατμισοδιαπνοή Αναφοράς:** είναι ο ρυθμός με τον οποίο νερό απομακρύνεται από μια υποθετική καλλιέργεια. Αποτελεί βασική παράμετρο για τον υπολογισμό των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό άρδευσης. Δίνεται σε χιλιοστά ανά ημέρα (mm/day).



Αγρομετεωρολογικό Δελτίο

Οδηγίες φυτοπροστασίας και καλής πρακτικής
για τους αγρότες, για τις καλλιέργειες Νοεμβρίου

Οι βασικές καλλιέργειες για τις οποίες δίνονται οδηγίες φυτοπροστασίας και καλής πρακτικής για τους αγρότες είναι οι εξής: [ελιές](#), [αμπέλια](#), [εσπεριδοειδή](#), [πατάτες](#), [φυλλοβόλα](#), [σιτάρι](#) και [κριθάρι](#).



Ελιές

- **Συγκομιδή:** Συνεχίζεται η συγκομιδή της κυπριακής λαδοελιάς για ελαιοποίηση, ενώ αρχίζει και η συγκομιδή της ποικιλίας Κορωνέϊκη για ελαιοποίηση. Συνεχίζεται, επίσης, η συγκομιδή μαύρων ελιών για επιτραπέζια χρήση.
- **Κλαδεμα – Φυτοπροστασία:** Γίνεται κλάδεμα καρποφορίας των δέντρων που συγκομίστηκαν. Συνίσταται στο αραίωμα κλάδων η αφαίρεση μη παραγωγικών βλαστών και βλαστών που δημιουργούν προβλήματα στο εσωτερικό της κόμης, καθώς και στον περιορισμό του ύψους των δέντρων.
- Γίνεται παρακολούθηση των πληθυσμών του δάκου της ελιάς με παγίδες. Εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα δολωματικοί ψεκασμοί ομαδικά. Ευνοϊκότερες θερμοκρασίες για το δάκο είναι οι θερμοκρασίες από 21 – 26°C, ενώ οι προσβολές μειώνονται αισθητά σε θερμοκρασίες πέραν των 35°C.



Ελιές

- **Υδατικές Ανάγκες:** Οι υδατικές ανάγκες του μήνα ανέρχονται στα 32 χιλιοστά.
- Οι πιο πάνω υδατικές ανάγκες υπολογίζονται για φυτείες που βρίσκονται στο στάδιο πλήρους ανάπτυξης και νοουμένου ότι ακολουθούνται οι ορθές καλλιεργητικές πρακτικές. Επιπρόσθετα, συστήνεται σε κάθε περίπτωση να αξιολογείται ποιοτικώς το νερό σε σχέση με τις υπό άρδευση καλλιέργειες.
- **Λίπανση:** Αν και σχετικά λιτοδίαιτη η ελιά, εντούτοις έχει ανάγκη απο λίπανση ώστε να έχει ικανοποιητική καρποφορία και παραγωγή κάθε χρόνο. Οι ποσότητες του λιπάσματος που χρειάζονται εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η ηλικία των δέντρων, η γονιμότητα του εδάφους και από το αν αρδεύονται ή όχι. Με τη λίπανση στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη συγκομιδή του ελαιοκάρπου μέχρι την άνθιση βοηθούμε τα ελαιόδεντρα να βρίσκονται σε άριστη θρεπτική κατάσταση, γιατί μέσα σε αυτή την περίοδο γίνεται η διαμόρφωση των οφθαλμών και η δημιουργία ικανοποιητικής άνθησης και καρποφορίας.
- Για αυτό οι λιπάνσεις πρέπει να γίνονται έγκαιρα για να υπάρχουν στη διάθεση των ελαιοδέντρων τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, όπως άζωτο, φώσφορος και κάλι. Η ποσότητα και ο τύπος των λιπασμάτων εξαρτάται από τις ανάγκες της καλλιέργειας, από τις ποσότητες των θρεπτικών συστατικών που βρίσκονται στο έδαφος και το νερό, καθώς και από το εάν θα εφαρμοστεί οποιαδήποτε άλλη εισροή, όπως κοπριά, λάσπη ή κομπόστα.



Ελιές

- Στα αρδευόμενα δέντρα, με την έναρξη των αρδεύσεων αρχίζουν και οι επιφανειακές λιπάνσεις. Συστήνεται οι ποσότητες των λιπασμάτων να δίνονται σε πολλές και μικρές δόσεις, τουλάχιστον τρεις. Η ορθολογική λίπανση προϋποθέτει αναλύσεις εδάφους τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια.
- Για τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η σταθερή τροφοδοσία συστήνεται η ακόλουθη συνταγή: N:35, P:8, K:12 ppm ανά τόνο νερού.
- Αν θα χρησιμοποιηθεί κοπριά ή λάσπη από βιολογικούς σταθμούς, θα πρέπει να ακολουθούνται οι πρόνοιες του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Η προσθήκη οργανικής ουσίας (κομπόστα, κοπριά, κτλ) συμβάλλει στη βελτίωση του εδάφους και κάθε 3-4 χρόνια πρέπει να επαναλαμβάνεται.



Αμπέλια

- **Λίπανση:** Πραγματοποιούνται πρακτικές βελτίωσης της γονιμότητας του εδάφους στους αμπελώνες, όπως είναι η εφαρμογή χλωρής λίπανσης ή και η εφαρμογή οργανικής ουσίας.
- Η χλωρή λίπανση αναφέρεται στη σπορά φυτών, κυρίως αζωτοδεσμευτικών όπως είναι το τριφύλι, ο βίκος και τα κουκιά, τα οποία αφού αναπτυχθούν, ενσωματώνονται στο έδαφος. Έτσι, εμπλουτίζουν το έδαφος με οργανική ουσία και άζωτο, βελτιώνοντας τη δομή και τη γονιμότητά του.
- Η οργανική ουσία, όπως η καλά χωνεμένη κοπριά βοηθά στη βελτίωση της εδαφικής δομής, στην αύξηση της υγρασίας και στη σταδιακή απελευθέρωση θρεπτικών συστατικών.
- Η ορθολογική λίπανση προϋποθέτει αναλύσεις εδάφους τουλάχιστον μία φορά κάθε 2-3 χρόνια. Αν θα χρησιμοποιηθεί κοπριά ή λάσπη από βιολογικούς σταθμούς, πρέπει να ακολουθούνται οι πρόνοιες του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Η προσθήκη οργανικής ουσίας (κομπόστα, κοπριά, κτλ) συμβάλλει στη βελτίωση του εδάφους και κάθε 3-4 χρόνια πρέπει να επαναλαμβάνεται.



Εσπεριδοειδή

- **Συγκομιδή:** Συνεχίζεται η συγκομιδή λεμονιών, πρώιμων ομφαλοφόρων πορτοκαλιών και γκρέιπφρουτ. Η εκκοπή πρέπει να γίνεται προσεκτικά με ψαλίδι, ώστε να μην πληγώνονται οι καρποί.
- **Φυτοπροστασία:** Γίνεται εφαρμογή φυτοοσμονών σε γκρέιπφρουτ και στην ποικιλία Μαντόρα για διατήρηση των καρπών στα δέντρα και παράταση της συγκομιδής τους. Συνεχίζεται η παρακολούθηση των πληθυσμών της μεσογειακής μύγας και η ανάλογη λήψη μέτρων φυτοπροστασίας.
- **Υδατικές Ανάγκες:** Οι υδατικές ανάγκες του μήνα ανέρχονται στα 10 χιλιοστά νερού.
- Οι πιο πάνω υδατικές ανάγκες υπολογίζονται για φυτείες που βρίσκονται στο στάδιο πλήρους ανάπτυξης και νοουμένου ότι ακολουθούνται οι ορθές καλλιεργητικές πρακτικές.
- **Λίπανση:** Τα εσπεριδοειδή προτιμούν εδάφη μέσης μηχανικής σύστασης, βαθιά και με καλή αποστράγγιση. Τα συμπαγή αργιλώδη εδάφη εμποδίζουν την οξυγόνωση και την ομαλή λειτουργία του ριζικού συστήματος. Προτιμούν ελαφρώς όξινα pH, όμως αναπτύσσονται κανονικά σε εύρος pH μεταξύ 6 και 7.5. Σε εδάφη με ανθρακικό ασβέστιο πάνω από 15% είναι σύνηθες φαινόμενο οι ελλείψεις ιχνοστοιχείων και κυρίως σιδήρου, ψευδαργύρου και μαγγανίου.



Εσπεριδοειδή

- Η ποσότητα και ο τύπος των λιπασμάτων εξαρτάται από τις ανάγκες της καλλιέργειας, από τις ποσότητες των θρεπτικών που βρίσκονται στο έδαφος και στο νερό, καθώς και από το εάν θα εφαρμοστεί οποιαδήποτε άλλη εισροή, όπως κοπριά, λάσπη ή κομπόστα. Ορθό είναι τουλάχιστον το 50% του αζώτου της βασικής λίπανσης να είναι σε αμμωνιακή μορφή ή το λίπασμα να διαθέτει την τεχνολογία της ελεγχόμενης αποδέσμευσης.
- Με την έναρξη των αρδεύσεων αρχίζουν και οι επιφανειακές λιπάνσεις. Συστήνεται οι ποσότητες των λιπασμάτων να δίνονται σε πολλές και μικρές δόσεις, τουλάχιστον τρεις. Για τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται σταθερή τροφοδοσία συστήνεται η ακόλουθη συνταγή: N:50, P:12, K:15 ppm ανά τόνο νερού.
- Η ορθολογική λίπανση προϋποθέτει αναλύσεις εδάφους τουλάχιστον μία φορά κάθε 2 χρόνια. Αν θα χρησιμοποιηθεί κοπριά ή λάσπη από βιολογικούς σταθμούς, πρέπει να ακολουθούνται οι πρόνοιες του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Η προσθήκη οργανικής ουσίας (κομπόστα, κοπριά, κτλ) συμβάλλει στη βελτίωση του εδάφους και κάθε 3-4 χρόνια πρέπει να επαναλαμβάνεται.



Πατάτες

- **Συγκομιδή:** Αρχίζει η εκρίζωση πατατών χειμερινής εσοδείας, καθώς και η συσκευασία και η μεταφορά πατατών χειμερινής εσοδείας σε σημεία διάθεσης (ντόπια αγορά και εξαγωγή).
- **Φυτοπροστασία:** Δυνατό να επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για εμφάνιση συμπτωμάτων αλτερνάριας αλλά και περονόσπορου. Πρέπει να γίνεται παρακολούθηση των πατατών χειμερινής εσοδείας για εμφάνιση συμπτωμάτων βοτρήτη ή σκληρωτίνιας και να γίνεται λήψη των απαιτούμενων μέτρων φυτοπροστασίας. Γίνεται αντιμετώπιση ζιζανίων όπου απαιτείται.
- Γίνεται εγκατάσταση βελτιωμένου συστήματος άρδευσης, καθώς επίσης και ορθή διαχείριση του πατατόσπορου, προβλάστησή του αλλά και τεμαχισμός του. Πραγματοποιείται, επίσης, συντήρηση μηχανημάτων και εξοπλισμού.
- **Φύτευση:** Συνεχίζεται η φύτευση πρώιμων πατατών εαρινής εσοδείας.
- **Υδατικές Ανάγκες:** Οι υδατικές ανάγκες του μήνα ανέρχονται στα 70 χιλιοστά νερού.



Πατάτες

- **Λίπανση:** Με τις αρδεύσεις αρχίζουν και οι επιφανειακές λιπάνσεις. Συστήνεται οι ποσότητες των λιπασμάτων να δίνονται σε πολλές και μικρές δόσεις, τουλάχιστον τρεις. Η σωστή διαχείριση της λίπανσης στις πατατοκαλλιέργειες συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων και ποιοτικών προϊόντων.
- Η πατάτα έχει σημαντικές ανάγκες σε άζωτο, φώσφορο και κάλι, η δε απρόσκοπτη προμήθεια τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια μεγάλη παραγωγή με άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ξηρής ουσίας και συγκέντρωση νιτρικών σε αποδεκτά όρια. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι με την κατάχρηση των λιπασμάτων, ιδιαίτερα των αζωτούχων, στα τελευταία στάδια ανάπτυξης των φυτών, προκαλείται υποβάθμιση της ποιότητας (μείωση της ξηράς ουσίας, αύξηση των νιτρικών, παραμόρφωση των κονδύλων, κτλ).
- Πρέπει να τονιστεί, πως η νιτρική μορφή του αζώτου είναι ευδιάλυτη στο νερό και ξεπλένεται εύκολα. Επομένως, οι ποσότητες αζώτου που τοποθετούνται σαν βασική λίπανση με τη φύτευση των πατατών πρέπει τουλάχιστον κατά ένα 50% να είναι αμμωνιακής μορφής ή το λίπασμα να διαθέτει την τεχνολογία της ελεγχόμενης αποδέσμευσης.



Πατάτες

- Η χρήση των λιπασμάτων πρέπει να γίνεται λελογισμένα έτσι ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος (νιτρορύπανση), να εξασφαλίζεται η αειφορία του εδάφους και τα παραγόμενα προϊόντα να είναι άριστης ποιότητας. Η ορθολογική λίπανση προϋποθέτει αναλύσεις εδάφους τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο.
- Η ποσότητα των θρεπτικών στοιχείων που χρειάζεται μια πατατοφυτεία είναι ανάλογη με την ποσότητα παραγωγής και ανάλογη με την πρωιμότητα της ποικιλίας και άρα το χρόνο φύτευσης πρώιμες/όψιμες/χειμερινές ή ανοιξιάτικες. Όσο πιο πρώιμη και χαμηλότερη είναι η παραγωγή, τόσο λιγότερες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων θα αξιοποιηθούν. Ενώ, όσο μεγαλύτερη είναι η βλαστική περίοδος και όσο πιο μεγάλη είναι η παραγωγή τόσο μεγαλύτερες είναι οι ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία. Σε γενικές γραμμές, τα εδάφη που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των πατατών είναι συνήθως πλούσια σε φωσφόρο αλλά ιδιαίτερα σε κάλι και μια ανάλυση εδάφους θα εξοικονομήσει μεγάλο μέρος του κόστους λίπανσης.



Πατάτες

- Για τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η σταθερή τροφοδοσία συστήνεται η ακόλουθη συνταγή ανάλογα πάντα με την εποχή φύτευσης N:130-150, P:40-50, K:150-180 ppm ανά τόνο νερού.
- Αν θα χρησιμοποιηθεί κοπριά ή λάσπη από βιολογικούς σταθμούς, πρέπει να ακολουθούνται οι πρόνοιες του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Η προσθήκη οργανικής ουσίας (κομπόστα, κοπριά κ.τ.λ) συμβάλλει στη βελτίωση του εδάφους και κάθε 3-4 χρόνια πρέπει να επαναλαμβάνεται.



Πατάτες

- **Ευνοϊκές συνθήκες για ανάπτυξη εχθρών και ασθενειών:**

- **Περνόςπορος**

Ατμοσφαιρική/Σχετική Υγρασία (RH) > 80%

Ήπιες θερμοκρασίες (10 - 25°C)

Βροχοπτώσεις συσσώρευσης > 20mm

- **Αλτερνάρια**

Ατμοσφαιρική/Σχετική Υγρασία (RH) > 80%

Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες: 10 - 35°C, ιδανικά: 24 - 29°C

Βροχή

- **Σκληρωτίνια**

Ατμοσφαιρική/Σχετική Υγρασία (RH) ~ 95 - 100%

Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες (20 - 25°C)

Βροχή/Άρδευση ευνοεί την ανάπτυξή τους

- Για τη λήψη μέτρων φυτοπροστασίας οι γεωργοί θα πρέπει, πέραν των ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης της ασθένειας, να λαμβάνουν υπόψη τους το ιστορικό προσβολών στη φυτεία τους και τις συστάσεις των Συμβούλων Γεωπόνων.



Φυλλοβόλα

- **Συγκομιδή:** Ολοκληρώνεται η συγκομιδή των φρούτων όψιμων ποικιλιών.
- Δεν υπάρχουν άλλες καλλιεργητικές ενέργειες για τα φυλλοβόλα κατά το μήνα Νοέμβριο.



Σιτάρι και Κριθάρι

- **Σπορά:** Αρχίζει η σπορά των σιτηρών. Αρχή γίνεται με τη σπορά κριθαριού και στη συνέχεια η σπορά συνεχίζει με σιτάρια. Κατάλληλη εποχή σποράς για το κριθάρι είναι από τις αρχές έως το τέλος του Νοέμβρη και για το σιτάρι από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.
- Η ποσότητα του σπόρου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15-18 κιλά το δεκάριο για πιστοποιημένο σπόρο και για σπόρο δικής του παραγωγής περί τα 20 κιλά ανά δεκάριο.
- Συστήνεται η χρήση γραμμικών σπορέων, οι οποίοι εξασφαλίζουν οικονομία σπόρου, καλύτερη κατανομή και ομοιόμορφο βάθος σποράς.
- **Φυτοπροστασία:** Για τη σπορά οι γεωργοί χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο ή δικό τους σπόρο που έχουν κρατήσει από την προηγούμενη χρονιά. Ο σπόρος ποικιλιών ευπαθών στις μυκητολογικές ασθένειες καλό είναι να εμβαπτίζεται σε διάλυμα μυκητοκτόνου για να αποφευχθούν προσβολές κατά τη βλαστική περίοδο.
- Οι βροχοπτώσεις στα σιτηρά είναι πάντα ευνοϊκές για όλη την καλλιεργητική περίοδο, νοουμένου ότι είναι κατανεμημένες ομοιόμορφα.



Σιτάρι και Κριθάρι

- Έντονες βροχοπτώσεις και μη ικανοποιητικές καιρικές συνθήκες που ευνοούν την υγρασία μπορεί να προκαλέσουν μυκητολογικές προσβολές, όπως οι σκωριάσεις σε ευαίσθητα είδη όπως για παράδειγμα το είδος τριτικάλε, με αποτέλεσμα να μειωθεί τόσο η παραγωγή όσο και η ποιότητά τους. Συνεπώς, ο συστηματικός έλεγχος των τεμαχίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων φυτοπροστασίας και επέμβαση εφόσον κριθεί αναγκαία.
- **Λίπανση:** Η λίπανση εφαρμόζεται ταυτόχρονα με τη σπορά, από τις αρχές του Νοέμβρη μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη.
- Η ποσότητα και ο τύπος των λιπασμάτων εξαρτάται από τις ανάγκες της καλλιέργειας, από τις ποσότητες των θρεπτικών συστατικών που βρίσκονται στο έδαφος, καθώς και από το εάν θα εφαρμοστεί οποιαδήποτε άλλη εισροή, όπως κοπριά ή λάσπη.
- Ορθό είναι τουλάχιστον το 50% του αζώτου να είναι σε αμμωνιακή μορφή ή το λίπασμα να διαθέτει την τεχνολογία της ελεγχόμενης αποδέσμευσης.
- Αν θα χρησιμοποιηθεί κοπριά ή λάσπη από βιολογικούς σταθμούς, πρέπει να ακολουθούνται οι πρόνοιες του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Η προσθήκη οργανικής ουσίας (κομπόστα, κοπριά κ.τ.λ) συμβάλλει στη βελτίωση του εδάφους και κάθε 3-4 χρόνια πρέπει να επαναλαμβάνεται.



Χάρτης Σταθμών Αναφοράς



Στον χάρτη παρουσιάζονται οι σταθμοί αναφοράς για τους οποίους ακολουθεί η εβδομαδιαία πρόγνωση καιρού

Πόλις Χρυσοχούς, Αερ. Πάφου, Αυδήμου, Νέο Λιμάνι Λεμεσού, Πεντάκωμο, Αερ. Λάρνακας, Άχνα, Αθηνών, Αστρομερίτης, Κανναβιού, Επταγώνεια, Αγρός

Σταθμοί Αναφοράς και Βασικές Καλλιέργειες ανά σταθμό

Σταθμός Αναφοράς	Καλλιέργειες	
Πόλις Χρυσοχούς	Ελιές	Σιτάρι - Κριθάρι
	Εσπεριδοειδή	
Αερ. Πάφου	Ελιές	Πατάτες
	Εσπεριδοειδή	Σιτάρι - Κριθάρι
Αυδήμου	Αμπέλια	
Νέο Λιμάνι Λεμεσού	Εσπεριδοειδή	
Πεντάκωμο	Ελιές Σιτάρι - Κριθάρι	
Αερ. Λάρνακας	Σιτάρι - Κριθάρι	
Άχνα	Πατάτες	
Αθηνένου	Ελιές Σιτάρι - Κριθάρι	
Αστρομερίτης	Ελιές	Πατάτες
	Εσπεριδοειδή	Σιτάρι - Κριθάρι
Κανναβιού	Ελιές Αμπέλια	
Επταγώνεια	Ελιές Εσπεριδοειδή	
Αγρός	Φυλλοβόλα	

Αγρομετεωρολογικό Δελτίο

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

Πρόγνωση καιρού για την περίοδο
03 - 09 Νοεμβρίου 2025

Σημείωση:

- Η πρόγνωση αυτή αποτελεί προϊόν αριθμητικής πρόγνωσης με βάθος χρόνου τις 10 ημέρες και δυνατό να αποκλίνει από την καθημερινή επίσημη πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας.
- Για την επίσημη πρόγνωση καιρού μπορείτε να ανατρέχετε στα δελτία καιρού που εκδίδονται καθημερινά από το Τμήμα Μετεωρολογίας και βρίσκονται εδώ: https://www.dom.org.cy/FORECAST/index_gr.html
- Για περισσότερες περιοχές, πέραν των βασικών σταθμών αναφοράς, ακολουθείστε την ιστοσελίδα **Αγρομετεωρολογίας** του Τμήματος στον ακόλουθο σύνδεσμο: <https://agromet.dom.org.cy/>

Συνοπτική κατάσταση περιόδου


03 - 09 Νοεμβρίου 2025

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από την Τετάρτη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

03 - 09 Νοεμβρίου 2025 - ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Πόλις Χρυσοχούς
(35° 2' 30.32", 32° 26' 13.96") - 22m asl



Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει αισθητή άνοδο την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα σημειώσει πτώση, για να παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα την Κυριακή. Παρόμοια συμπεριφορά αναμένεται και στην ελάχιστη θερμοκρασία.


Δεν αναμένεται βροχόπτωση.

Ασθενές προς μέτριο πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι την Κυριακή.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

03 - 09 Νοεμβρίου 2025 - Αερ. ΠΑΦΟΥ

Αεροδρόμιο Πάφου
(34°42'55.84", 32°28'44.96") - 8m asl



Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα μέχρι την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα σημειώσει μικρή πτώση, για να παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα το Σάββατο και την Κυριακή. Παρόμοια συμπεριφορά αναμένεται και στην ελάχιστη θερμοκρασία.

Δεν αναμένεται βροχόπτωση.


Ασθενές προς μέτριο πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι την Κυριακή.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

03 - 09 Νοεμβρίου 2025 - ΑΥΔΗΜΟΥ

Αυδήμου

(34°41'3.91", 32°45'26.70") - 51m asl



Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα μέχρι την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα σημειώσει αισθητή πτώση, για να παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα το Σάββατο και την Κυριακή. Παρόμοια συμπεριφορά αναμένεται και στην ελάχιστη θερμοκρασία.


Δεν αναμένεται βροχόπτωση.

Ασθενές προς μέτριο πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι την Κυριακή.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

03 - 09 Νοεμβρίου 2025 - ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

Νέο Λιμάνι Λεμεσού
(34°39'24.85", 33° 0'56.81") - 3m asl



Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει αισθητή άνοδο την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα σημειώσει αισθητή πτώση, για να παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα μέχρι την Κυριακή. Παρόμοια συμπεριφορά αναμένεται και στην ελάχιστη θερμοκρασία.

Δεν αναμένεται βροχόπτωση.


Ασθενές προς μέτριο πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι την Κυριακή, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να ενισχύεται μέχρι ισχυρό.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

03 - 09 Νοεμβρίου 2025 - ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ

Πεντάκωμο

(34°42'27.21", 33°15'42.24") - 23m asl



Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα σημειώσει αισθητή πτώση, για να παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα μέχρι την Κυριακή. Παρόμοια συμπεριφορά αναμένεται και στην ελάχιστη θερμοκρασία.


Δεν αναμένεται βροχοπτώση.

Ασθενές προς μέτριο πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι την Κυριακή, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να ενισχύεται μέχρι ισχυρό.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

03 - 09 Νοεμβρίου 2025 - Αερ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Αεροδρόμιο Λάρνακας
(34°52'24.71", 33°37'2.57") - 2m asl



Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα μέχρι την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα σημειώσει αισθητή πτώση, για να παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα μέχρι την Κυριακή. Παρόμοια συμπεριφορά αναμένεται και στην ελάχιστη θερμοκρασία.

Δεν αναμένεται βροχόπτωση.


Ασθενές προς μέτριο πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι την Κυριακή.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

03 - 09 Νοεμβρίου 2025 - ΑΧΝΑ

Αχνα

(35° 1'31.98", 33°46'27.69") - 57m asl



Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση μέχρι την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο θα σημειώσει μικρή άνοδο, για να παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα την Κυριακή. Παρόμοια συμπεριφορά αναμένεται και στην ελάχιστη θερμοκρασία.

Ασθενείς βροχές ενδέχεται να σημειωθούν την Παρασκευή.


Ασθενές προς μέτριο πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι την Κυριακή, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να ενισχύεται μέχρι ισχυρό.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

03 - 09 Νοεμβρίου 2025 - ΑΘΗΝΟΥ

Αθηνών

(35° 3'0.30", 33°32'31.73") - 182m asl



Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα μέχρι την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο θα σημειώσει αισθητή πτώση, για να παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα την Κυριακή. Παρόμοια συμπεριφορά αναμένεται και στην ελάχιστη θερμοκρασία.


Δεν αναμένεται βροχόπτωση.

Ασθενές προς μέτριο πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι την Κυριακή.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

03 - 09 Νοεμβρίου 2025 - ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

Αστρομερίτης
(35° 7'58.02", 33° 1'11.52") - 159m asl



Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα μέχρι την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα σημειώσει πτώση, για να παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα την Κυριακή. Παρόμοια συμπεριφορά αναμένεται και στην ελάχιστη θερμοκρασία.

Ασθενείς βροχές ενδέχεται να σημειωθούν τη νύχτα της Δευτέρας.


Ασθενές προς μέτριο πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι την Κυριακή.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

03 - 09 Νοεμβρίου 2025 - KANNABIOY

Κανναβιού

(34°55'47.23", 32°35'9.48") - 422m asl



Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει άνοδο την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα σημειώσει αισθητή πτώση, για να παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα μέχρι την Κυριακή. Παρόμοια συμπεριφορά αναμένεται και στην ελάχιστη θερμοκρασία.

Δεν αναμένεται βροχόπτωση.


Ασθενές προς μέτριο πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι την Κυριακή.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

03 - 09 Νοεμβρίου 2025 - ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

Επταγώνεια

(34°50'50.12", 33° 0' 36.14") - 512m asl



Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα μέχρι την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα σημειώσει πτώση, για να παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα την Κυριακή. Παρόμοια συμπεριφορά αναμένεται και στην ελάχιστη θερμοκρασία.


Δεν αναμένεται βροχόπτωση.

Ασθενές προς μέτριο πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι την Κυριακή, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να ενισχύεται μέχρι ισχυρό.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

03 - 09 Νοεμβρίου 2025 - ΑΓΡΟΣ

(34°54'53.29", 33° 0'56.54") - 998m asl



Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα μέχρι την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα σημειώσει πτώση, για να παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα την Κυριακή. Παρόμοια συμπεριφορά αναμένεται και στην ελάχιστη θερμοκρασία.

Δεν αναμένεται βροχόπτωση.

Ασθενές προς μέτριο πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι την Κυριακή.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

03 - 09 Νοεμβρίου 2025 - ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(mm/day)


**

	ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ	ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ	3.53	4.20	4.42	4.89	5.32	3.33	3.86
ΑΕΡ. ΠΑΦΟΥ	4.03	4.95	5.14	4.24	4.08	3.89	4.62
ΑΥΔΗΜΟΥ	3.79	5.42	5.18	5.65	4.87	4.13	5.02
ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΜΕΣΟΥ	3.82	5.21	5.14	6.89	4.33	3.76	4.53
ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ	3.86	3.92	5.55	5.69	3.79	3.58	4.16
ΑΕΡ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ	5.70	5.13	5.54	5.52	3.50	4.36	4.72
ΑΧΝΑ	6.24	5.40	5.52	5.41	3.44	4.27	5.16
ΑΘΗΝΟΥ	5.66	5.52	5.41	5.37	5.04	4.46	4.94
ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ	5.21	4.87	5.20	5.15	4.42	3.94	4.40
ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ	4.01	5.32	5.60	5.33	4.44	3.59	4.29
ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ	4.49	4.94	6.29	7.33	4.76	3.67	4.48
ΑΓΡΟΣ	3.68	4.37	4.48	5.63	4.44	2.92	3.99

** Η εξατμισοδιαπνοή αναφοράς είναι ένας κρίσιμος δείκτης για την εκτίμηση των αναγκών άρδευσης στις γεωργικές καλλιέργειες. Η εξατμισοδιαπνοή αναφοράς είναι η απώλεια του νερού που τυγχάνει από την εξάτμιση που συμβαίνει στην επιφάνεια του εδάφους με τη συνδυασμένη απώλεια νερού που τυγχάνει από τη διαπνοή της φυτοκόμης. Στο Αγρομετεωρολογικό Δελτίο, η παράμετρος αυτή υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Penman - Monteith (FAO 56) και προκύπτει από προγνωστικά μοντέλα και μετεωρολογικές μετρήσεις. Οι τιμές που παρουσιάζονται στον πίνακα ενδέχεται να παρουσιάζουν αποκλίσεις λόγω του περιθωρίου σφάλματος που προκύπτει από τις προγνωστικές διαδικασίες του μοντέλου.

Εβδομαδιαίος Χάρτης Κατανομής της Βροχόπτωσης

Για την περίοδο 27 Οκτ. - 02 Νοεμ. 2025



Προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα

Για οποιεσδήποτε προειδοποιήσεις που αφορούν καιρικά φαινόμενα οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί καλούνται όπως παρακολουθούν τις προειδοποιήσεις καιρού όπως αυτές εκδίδονται από το Τμήμα Μετεωρολογίας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

<https://www.dom.org.cy/WARNING/>





- Το παρόν αγρομετεωρολογικό δελτίο παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και σκοπό έχει να δείξει την τάση που αναμένεται να ακολουθήσει ο καιρός, έχοντας υπόψιν τις ανάγκες του Αγρότη. Οι πληροφορίες βασίζονται σε διαθέσιμα δεδομένα και επιστημονικά μοντέλα πρόβλεψης, τα οποία υπόκεινται σε αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μην είναι απόλυτα ακριβή, ιδιαίτερα όσο απομακρυνόμαστε από τον χρόνο έκδοσής του.
- Οι σταθμοί αναφοράς του Τμήματος Μετεωρολογίας είναι σημειακοί και τα δεδομένα τους ισχύουν για τη συγκεκριμένη περιοχή και δεν μπορούν να θεωρούνται κατ' ανάγκη αντιπροσωπευτικά για όλες τις παραπλήσιες περιοχές, αφού κάθε περιοχή επηρεάζεται από μικρόκλιμα.
- Οι χρήστες του δελτίου αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια βασιστεί στις παρεχόμενες πληροφορίες. Συνιστάται η διασταύρωση των δεδομένων και η χρήση τους σε συνδυασμό με άλλες αξιόπιστες πηγές ή επαγγελματικές συμβουλές. Ο εκδότης του δελτίου δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του παρόντος δελτίου.





- Η πρόγνωση αυτή αποτελεί προϊόν αριθμητικής πρόγνωσης με βάθος χρόνου τις 10 ημέρες και δυνατό να αποκλίνει από την καθημερινή επίσημη πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας. Για την επίσημη πρόγνωση καιρού μπορείτε να ανατρέχετε στα δελτία καιρού που εκδίδονται καθημερινά από το Τμήμα Μετεωρολογίας και βρίσκονται εδώ:

https://www.dom.org.cy/FORECAST/index_gr.html

- Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες μπορεί να αλλάξουν απρόβλεπτα. Για κρίσιμες αποφάσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Μετεωρολογίας για να λάβετε τα πρόσφατα δελτία καιρού ή να μιλήσετε με το Γραφείο Πρόγνωσης Καιρού (Τηλ: 24802977).



Διάφοροι σύνδεσμοι για περισσότερες πληροφορίες

- Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου:
<https://www.moa.gov.cy/moa/dm/dm.nsf/home/home?openform>
- Καθημερινή πρόγνωση καιρού:
https://www.dom.org.cy/FORECAST/index_gr.html
- Προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα:
<https://www.dom.org.cy/WARNING/>
- Κλιματολογικές πληροφορίες και αναφορές:
<https://www.dom.org.cy/CLIMATOLOGY/Greek/>
- Μετρήσεις αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, ανά δεκάλεπτο, αποτυπωμένες σε πολλαπλούς χάρτες:
https://www.dom.org.cy/AWS/AWS_Mosaic.html
- Μετρήσεις αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, ανά δεκάλεπτο, αποτυπωμένες σε χάρτη:
https://www.dom.org.cy/AWS/ALL_STATIONS_MAP.html
- Χρονοσειρές μετρήσεων αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών:
https://www.dom.org.cy/AWS/AWS_METEOGRAMS/index.html
- Πρόσφατες εικόνες RADAR:
https://www.dom.org.cy/RADAR_IMG/index.html



Διάφοροι σύνδεσμοι για περισσότερες πληροφορίες

- Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος:
<https://www.gov.cy/moa/>
- Τμήμα Γεωργίας Κύπρου:
<https://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/home/home?openform>
- Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης:
<https://eratosthenes.org.cy/>



Συνεργάτες

Το παρόν Αγρομετεωρολογικό Δελτίο αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του [Τμήματος Μετεωρολογίας](#), του [Τμήματος Γεωργίας](#) Κύπρου, καθώς επίσης και του [Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ](#), ενώ είναι υπό την αιγίδα του [Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος](#).

